

Сигналізаційне (термінове) повідомлення № 10
про фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур
у сільгосппідприємствах Херсонської області
станом на 20 червня 2025 року

Увага - сарана!

Висока температура повітря і посушлива погода цього року спричинила масове розмноження та збільшення чисельності небезпечного багатідного шкідника – **сарани**, а саме **італійського пруса** на території **Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району** Херсонської області. Відмічено пошкодження шкідником сільськогосподарських рослин (соняшнику).

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області рекомендує спеціалістам господарств організувати постійний нагляд за поведінкою саранових місцевих популяцій та при необхідності провести локалізацію вогнищ надпорогової їх чисельності. Термінові обстеження слід проводити в першу чергу на занедбаних сільськогосподарських угіддях, пасовищах, неугіддях, луках, узбіччях доріг. Обстеження необхідно проводити рано вранці або пізно ввечері, коли саранові перебувають на рослинах у стані відносного спокою.

Обприскування проводять за чисельності личинок італійського пруса 2–5 екз./м², нестадних саранових – 10–15 екз./м². Основну масу личинок стадних саранових слід ліквідувати до закінчення розвитку третього-четвертого віків, до окрилення сарани. Обробки проводять вранці та ввечері, коли комахи перебувають на рослинах. Осередки підвищеної чисельності слід локалізувати дозволеними препаратами на основі однієї із діючих речовин: альфа-циперметрин, 100 г/л; лямбда-цигалотрин, 50 г/л; хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л; лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 141 г/л; ацетаміприд, 200 г/кг; піріміфос-метил, 500 г/л; ацетаміприд, 100 г/кг + лямбда-цигалотрин, 30 г/кг; люфенурон, 50 г/л. За температури повітря вище 25°C ефективніші фосфорорганічні інсектициди або суміші препаратів.

Нагадуємо що до роботи з пестицидами допускаються лише ті особи, які пройшли навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та мають посвідчення про право роботи з пестицидами.

Важливо! Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області наголошує, що під час проведення заходів з застосування засобів захисту рослин слід суворо дотримуватися санітарних правил, регламентів застосування препаратів, правил і заходів з охорони праці та використовувати препарати лише відповідно до «Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

За необхідності застосування хімічного обробітку за 3 доби попередити органи місцевого самоврядування, власників пасік про час та місце проведення (вказати назву, ступінь і строк дії токсичності препарату). Обробки необхідно проводити в тиху, безвітряну погоду в ранішні та вечірні години.

Пам'ятаймо! Під час проведення польових робіт в умовах воєнного стану, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження умов праці.

Наголошуємо! У разі виявлення осередків саранових, а саме її найпоширеніших видів: сарана італійська, або прус; перелітна, чи азійська, необхідно терміново повідомити про це Головне Управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та для недопущення масового поширення небезпечного шкідника провести захист посівів та інших угідь, дозволеними до використання в Україні інсектицидами відповідно до рекомендованих норм та санітарних правил.

