

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 09.10.2025**

Озима пшениця – проростання зерна, сходи, продовження сівби.

Озимий ріпак – утворення листової розетки, на посівах кінця першої декади вересня - сходи.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у першій декаді жовтня переважала помірно тепла, з незначними та нерівномірними опадами погода. Вночі та вранці спостерігалися тумани.

Максимальна температура повітря підвищувалась у найтепліші дні декади до +21°C.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч декади до 8-10°C тепла.

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до +47-48°C, в нічні години охолоджувалась до 8-10°C тепла.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила +17-18°C.

Агromетеорологічні умови протягом декади для продовження проведення сівби та початкового росту вже посіяних озимих культур склались задовільно. Дощі, які пройшли в звітному періоді покращили ситуацію з вологозабезпеченням, але запаси вологи у ґрунті залишаються недостатніми.

Мишоподібні гризуни за чисельності 0,5-1,0, макс. 3,0 жилих колонії на гектар, продовжують зосереджуватися в місцях резервацій (на полях незораних після жнив, неугіддях, лісосмугах, садах, пасовищах) та на полях після збирання соняшнику, кукурудзи, овочевих культурах та багаторічних травах. Чисельність їх поступово збільшується. На занедбаних площах, які не обробляються, чисельність шкідника становить 2,2-4,0 жилих кол/га, з чисельністю жилих нір 10-20 шт./га. Заселення посівів озимих культур гризунами поки що не спостерігається.

В теплі сонячні дні на посівах **озимого ріпаку** продовжували шкодити **хрестоцвіті блішки**, чисельність 0,5 – 3,0 екз./м², пошкоджено від 1% до 3% рослин, площа заселення – 53%.

Несправжніми гусеницями **ріпакового пильщика** за чисельності – 0,5-1,0 екз./рослину, заселено 23% площ, 2% рослин у слабкому ступені.

Продовжується живлення гусениць **капустяного та ріпакового біланів**, які пошкодили до 2% рослин, за чисельності 0,5-1 екз./м².

Триває шкодочинність гусениць **капустяної молі** на 22% обстежених площ посівів озимого ріпаку, середня чисельність становить 1 гус./роsl., максимально – 2, заселено 2% рослин.

У північних районах продовжується живлення гусениць **совок**, переважно озимої та бавовникової. Середня чисельність шкідника становить 0,6 екз./м², в осередках до 2,0 екз./м². Заселено 35% обстежених площ.

На озимині, розміщеної після стерньових попередників триває шкодочинність личинок **хлібного туруна (жужелиці)** за середньої чисельності личинок 0,3-0,5 екз/м², максимально 1 екз/м². Заселено 5% обстежених площ.

В теплі сонячні дні проходив літ **цикадок**, середня чисельність шкідника становить - 4-8 екз/100 п.с., тривав слабкий літ та відкладання яєць осіннього покоління **злакових мух**, середня їх чисельність становить - 2-5 екз/100 п.с.

Триває шкодочинність гусениць **озимої совки** II покоління на 3% обстежених площ посівів озимої пшениці, середня чисельність – 0,3 екз./м², максимально – 1 екз./м².

Клоп-шкідлива черепашка перебуває у місцях зимівлі (лісосмуги), де його чисельність складає 0,5-0,8 максимально 2,0 екз/м², при заселенні 37% обстеженої площі.