

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 30.10.2025**

Озима пшениця – на посівах середини вересня відмічався 3-й листок. На посівах початку жовтня - проростання зерна та сходи. Стан посівів від доброго до задовільного.

Озимий ріпак – утворення листової розетки. Стан посівів від доброго до задовільного.

Плодові дерева: осіннє забарвлення листя.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині погоду більшої частини третьої декади жовтня визначало поле зниженого тиску і атмосферні фронти. Часом пройшли помірні та сильні дощі.

Середня декадна температура повітря становила +9,1-9,5°C, що на 1,4-1,6°C вище кліматичної норми (1991-2020 рр.).

Максимальна температура повітря підвищувалась у найтепліші дні декади до +17-19°C.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч декади до +4°C.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила +11-12°C.

Агromетеорологічні умови для початкового росту озимих культур склались задовільно. Опади протягом звітнього періоду покращили ситуацію з вологозабезпеченням.

Триває осіння міграція **мишоподібних гризунів** з місць резервації. Сприятливі погодні умови та достатня кількість кормів сприяють незначному збільшенню чисельності житлових нір гризунів та їх поширенню в агроценозах.

Триває розселення гризунів у середину полів **озимих зернових та ріпаку**. Шкідниками заселено 10% обстежених площ посівів озимих культур, виявлено поодинокі нори, максимально - 1 кол./га з 3 житловими норами (на крайових смугах).

В **багаторічних травах** заселено 50% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників - 1 кол./га з 1,3 жилими норами, максимально - 2 кол./га з 3 жилими норами.

Підвищена чисельність гризунів спостерігається на **неугіддях** та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 1-3, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 2 - 10 штук.

На цей час в області спостерігається чисельність шкідника на рівні минулорічних показників.

На посівах озимого ріпаку продовжується живлення гусениць **озимої совки** II покоління на 35% обстежених площ. Середня чисельність шкідника

становить 0,6 екз./м², в осередках до 2,0 екз./м². За віковим складом переважають гусениці IV- VI віків.

Попелиці харчуються на 20% обстежених площ посівів озимого ріпаку. Заселено у середньому 1% рослин, максимально – 3% за середньої чисельності 1 кол./роsl.

Хрестоцвітими блішками за чисельність 0,2 – 1,0 екз./м², пошкоджено від 1% до 3% рослин, площа заселення – 30%.

Завершується живлення несправжніх гусениць **ріпакового пильщика** на 25% обстежених площ, заселено у середньому 2% рослин, середня чисельність – 0,5-1,0 гус./роsl. За віковим складом переважають гусениці IV- VI віків.

Пероноспорозом уражено 15% обстежених площ, у середньому – 1,5% рослин, максимально - 3%. Розвиток хвороби – 1%.

На озимині, розміщеної після стерньових попередників триває шкодочинність личинок **хлібного туруна (жужелиці)** за середньої чисельності личинок 0,3-0,5 екз./м², максимально 1 екз./м². Заселено 8% обстежених площ. За віковим складом личинки II віку становлять 42%, III – 58%.

Триває шкодочинність гусениць **озимої совки** II покоління на 10% обстежених площ посівів озимої пшениці, середня чисельність – 0,5 екз./м², максимально – 1 екз./м².

Борошниста роса на сходах озимої пшениці уразила 10% обстежених площ, у середньому – 1% рослин, розвиток хвороби – 0,5%.