

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану  
сільськогосподарських рослин в господарствах Херсонської області  
станом на 02.10.2025**

**Озима пшениця** – сівба.

**Озимий ріпак** – сходи. На посівах початку вересня – утворення листової розетки. Стан посівів добрий.

**Плодові дерева: груша** – осіннє забарвлення листя.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у другій половині третьої декади вересня улоговина Чорноморського циклону та пов'язані з ним атмосферні фронти обумовили проходження невеликих та помірних дощів. З 25 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, на території області відбулось зниження температурного режиму. 26-27 вересня спостерігались перші осінні заморозки на поверхні ґрунту та на висоті 2 см над поверхнею ґрунту. В окремі дні на заході області пориви вітру сягали 17-22 м/с.

**Середня декадна температура повітря** становила +14,1-14,6°C, що на 1°C нижче кліматичної норми (1991-2020 рр.).

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через +15° в бік зниження (*кінець метеорологічного літа та початок метеорологічної осені*) відбувся 25 вересня, що в межах середніх багаторічних дат переходу. Метеорологічне літо по області тривало 127 днів.

**Максимальна температура повітря** підвищувалась у найтепліші дні декади (24 вересня) до +29°C.

**Мінімальна температура повітря** знижувалась у прохолоднішу ніч декади (28 вересня) до 1-3°C тепла.

**Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см** становила +17-18°C.

Агрометеорологічні умови протягом декади для продовження проведення сівби та початкового росту вже посіяних озимих культур склались задовільно. Кількості опадів було недостатньо для формування достатнього зволоження ґрунту. Для досягання та збирання врожаю овочевих культур умови були сприятливі.

**Мишоподібні гризуни** за чисельності 0,5-1,0, макс. 2,0 жилих колонії на гектар, продовжують зосереджуватися в місцях резервацій (на полях незораних після жнив, неугіддях, лісосмугах, садах, пасовищах) та на полях після збирання соняшнику, кукурудзи, овочевих культурах та багаторічних травах. Чисельність їх поступово збільшується. На занедбаних площах чисельність шкідника становить 3,0 жилих кол/га. Заселення посівів озимих культур гризунами поки що не спостерігається.

В теплі сонячні дні на посівах **озимого ріпаку** продовжували шкодити *хрестоцвітні блішки*, чисельність 0,5 – 3,0 екз./м<sup>2</sup>, пошкоджено від 1% до 3% рослин, площа заселення – 53%.

Несправжніми гусеницями *ріпакового пильщика* за чисельності – 0,5-1,0 екз./рослину, пошкоджено 1% рослин у слабкому ступені.

Продовжується живлення гусениць *капустяного та ріпакового біланів*, які пошкодили до 2% рослин, за чисельності 0,5-1 екз./м<sup>2</sup>.

Триває шкодочинність гусениць *капустяної молі* на 20% обстежених площ посівів озимого ріпаку, середня чисельність становить 1 гус./роsl., максимально – 2, заселено 2% рослин.

У північних районах відмічено живлення гусениць *совок*, переважно озимої та бавовникової. Середня чисельність шкідника становить 0,6 екз./м<sup>2</sup>, в осередках до 2,0 екз./м<sup>2</sup>. Заселено 35% обстежених площ.

На сходах падалиці продовжується розвиток *хлібного туруна (жужелиці)* за середньої чисельності імаго 0,5-1,0 екз./м<sup>2</sup>, максимально 2,0 екз./м<sup>2</sup>, чисельність личинок 0,2-0,3 екз./м<sup>2</sup>, максимально 1 екз./м<sup>2</sup>.

В теплі сонячні дні проходив літ *цикадок*, середня чисельність шкідника становить - 4-8 екз./100 п.с., слабкий літ та відкладання яєць осіннього покоління *злакових мух*, середня їх чисельність становить - 2-5 екз./100 п.с., окремі рослини пошкоджені гусеницями *озимої совки*.

*Клоп-шкідлива черепашка* перебуває у місцях зимівлі (лісосмуги), де його чисельність складає 0,5-0,8 максимально 2,0 екз./м<sup>2</sup>, при заселенні 37% обстеженої площі.

На пізніх посадках *овочевих культур* в приватному секторі закінчується харчування гусениць *помідорної та бавовникової совок* III покоління. Гусениці пошкодили 2-5% плодів, середня чисельність бавовникової совки становить 1,0 екз./рослину, карадрини – 0,8 екз./рослину.

Погодні умови (різкі коливання температур, тумани, роси) сприяють ураженню пізніх сортів томатів фітофторозом, макроспоріозом. *Фітофторозом* уражено до 20% рослин на 75% площ, розвиток хвороби 2%, *макроспоріозом* уражено 5% рослин на 20% площ.

На незахищених площах *пізньої капусти*, переважно у приватному секторі шкодять гусениці капустяної *совки* (1,0 екз./рослину), гусениці *біланів* (1,3 екз./рослину), *молей* (2-5 екз./рослину), *хрестоцвітні блішки*, середня чисельність блішок на одну рослину становить до 10,2 екземплярів. Шкідники продовжують свій розвиток на 5%, максимум 15% рослин.