

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 13.11.2025**

Озима пшениця – утворення вузлових коренів та кушіння. Висота рослин в середньому складала 11-12 см. Стан посівів від доброго до задовільного.

Озимий ріпак – утворення листової розетки. Стан посівів від доброго до задовільного.

Плодові дерева – листопад.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині погоду другої частини I декади та початку II декади листопада визначало поле підвищеного тиску, в окремі дні атмосферні фронти обумовили невеликі та помірні дощі. Часом в нічні та ранкові години спостерігались тумани з обмеженням видимості до 200-500 м.

Середня декадна температура повітря становила 9,0-9,6°C тепла, що на 2,9°C вище кліматичної норми (1991-2020 рр.).

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліший день до +16-17°C.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч до 4-6°C тепла.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила 9-10°C тепла.

Середня відносна вологість повітря становила 88-89%.

Протягом декади тривала осіння вегетація озимих культур. Погодні умови сприяли зміні фазового розвитку у рослин.

Помірно тепла, волога погода, наявність достатньої кормової бази позитивно впливає на розвиток популяції мишей та полівок. Триває міграція **мишоподібних гризунів** на площі озимини, переважно з країв полів, де продовжується поступове наростання їх чисельності. При маршрутному обстеженні сільськогосподарських посівів виявлено збільшення заселених площ та житлових нір гризунів.

Станом на 13 листопада чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 15% обстежених площ, середня чисельність – 1 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 3 - 6 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 19% обстежених площ, середня чисельність – 1 жила кол./га, максимально – 2 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5 - 7 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 50% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,1 жила кол./га з 1,5 жилими норами, максимально – 2 жилих кол./га з 5 жилими норами. Підвищена чисельність гризунів спостерігається на **неугіддях** та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився

післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,1, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 2 - 10 штук.

На озимині, розміщеної після стерньових попередників триває шкодочинність личинок **хлібного туруна (жуужелиці)** за середньої чисельності личинок 0,3-0,5 екз/м², максимально 1 екз/м². Заселено 8% обстежених площ. За віковим складом личинки II віку становлять 30%, III – 70%.

Триває шкодочинність гусениць **озимої совки** II покоління (V-VI віку) на 10% обстежених площ посівів озимої пшениці, середня чисельність – 0,5 екз./м², максимально – 1 екз./м².

Волога з туманами та дощова погода звітного періоду сприяла розвитку та поширенню хвороб на ранніх розкущених посівах озимої пшениці. Виявлено збільшення відсотка уражених площ та рослин хворобами: **борошниста роса** на сходах озимої пшениці уразила 20% обстежених площ, у середньому – 1,8% рослин, розвиток хвороби – 1%; **септоріоз** уразив 5% площ посіву озимої пшениці, у середньому - 0,5% рослин, з розвитком хвороби - 0,5%; **бура листкова іржа** уразила 3% площ посіву озимої пшениці, у середньому - 0,5% рослин, з розвитком хвороби - 0,5%; **кореневі гнилі** на посівах озимої пшениці. Уражено 3% площ та 0,2% рослин, розвиток хвороби - 0,2%.

На посівах озимого ріпаку триває живлення гусениць **озимої совки** II покоління на 35% обстежених площ. Середня чисельність шкідника становить 0,6 екз./м², в осередках до 2,0 екз./м². За віковим складом переважають гусениці V- VI віків.

Попелиці харчуються на 27% обстежених площ посівів озимого ріпаку. Заселено у середньому 1% рослин, максимально – 3% за середньої чисельності 1 кол./роsl.

На ріпаку утримання вологої (ранкові тумани) та дощової погоди протягом звітного періоду сприяло розвитку та поширенню хвороб: **пероноспорозом** уражено 30% обстежених площ, у середньому – 1,5% рослин, максимально - 3%. Розвиток хвороби – 1,5%; **альтернаріозом** уражено 25% обстежених площ, у середньому – 1,1% рослин, максимально - 2%. Розвиток хвороби – 0,5%.