

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 20.11.2025**

Озима пшениця – 3 листки, кушіння. Стан посівів від доброго до задовільного.

Озимий ріпак – утворення листової розетки. Стан посівів від доброго до задовільного.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині тепло, як для цієї пори року погоду II декади листопада визначало поле підвищеного тиску, в останні дні декади атмосферні фронти обумовили проходження помірних та сильних дощів. В нічні та ранкові години спостерігались тумани з обмеженням видимості до 200-500 м. Осінь продовжує дивувати аномальним теплом. 18 листопада середня добова температура повітря склала +13,9°C, що є температурним рекордом.

Середня декадна температура повітря становила 9,0-9,6°C тепла, що на 2,9°C вище кліматичної норми (1991-2020 рр.).

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліший день до +17-18°C.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч до 4-6°C тепла.

Кількість опадів на півночі та заході області склала 10 мм (130% декадної норми).

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила 9-10°C тепла.

Опади які пройшли у звітному періоді значно покращили ситуацію з вологозабезпеченням. Триває осіння вегетація озимих культур.

Станом на 20 листопада чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 20% обстежених площ, середня чисельність – 1 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 3 - 6 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 22% обстежених площ, середня чисельність – 1 жила кол./га, максимально – 2 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5 - 7 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 50% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,1 жила кол./га з 1,5 жилими норами, максимально – 2 жилих кол./га з 5 жилими норами. Підвищена чисельність гризунів спостерігається на **неугіддях** та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,1, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 2 - 10 штук.

На озимині, розміщеної після стерньових попередників триває шкодочинність личинок **хлібного туруна (жуужелиці)** за середньої чисельності личинок 0,3-0,5 екз/м², максимально 1 екз/м². Заселено 8% обстежених площ. За

віковим складом личинки II віку становлять 30%, III – 70%. Подальший розвиток та шкідливість личинок туруна залежатимуть від погодних умов.

Триває шкодочинність гусениць *озимої совки* II покоління (V-VI віку) на 10% обстежених площ посівів озимої пшениці, середня чисельність – 0,5 екз./м², максимально – 1 екз./м².

Попелицями заселено 10% обстежених площ посівів озимої пшениці. Середня чисельність – 1 екз./роsl., максимально – 1 кол./роsl. Заселено у середньому 1%, максимально -3% рослин.

Волога з туманами та дощова погода звітного періоду сприяла розвитку та поширенню хвороб на ранніх розкущених посівах озимої пшениці. Виявлено збільшення відсотка уражених площ та рослин хворобами: **борошнистою россою** на сходах озимої пшениці уразила 22% обстежених площ, у середньому – 2% рослин, розвиток хвороби – 1,5%; **септоріоз** уразив 10% площ посіву озимої пшениці, у середньому - 1% рослин, з розвитком хвороби - 1%; **бура листкова іржа** уразила 3% площ посіву озимої пшениці, у середньому - 0,5% рослин, з розвитком хвороби - 0,5%; **кореневі гнилі** на посівах озимої пшениці. Уражено 3% площ та 0,3% рослин, розвиток хвороби - 0,3%.

На посівах озимого ріпаку триває живлення гусениць *озимої совки* II покоління на 35% обстежених площ. Середня чисельність шкідника становить 0,6 екз./м², в осередках до 2,0 екз./м². За віковим складом переважають гусениці V- VI віків.

Попелиці харчуються на 30% обстежених площ посівів озимого ріпаку. Заселено у середньому 1% рослин, максимально – 3% за середньої чисельності 1 кол./роsl.

У теплі сонячні дні спостерігалася шкодочинність *хрестоцвітних блішок* на посівах озимого ріпаку. Заселено 10% обстежених площ, середня чисельність – 0,1 екз./м², максимально – 1 екз./м². Пошкоджено у середньому 1% рослин, максимально – 2% у слабкому ступені.

Утримання вологої (ранкові тумани) та дощової погоди протягом звітного періоду сприяло розвитку та поширенню хвороб озимого ріпаку: **пероноспорозом** уражено 32% обстежених площ, у середньому – 2% рослин, максимально - 4%. Розвиток хвороби – 1,5%; **альтернаріозом** уражено 27% обстежених площ, у середньому – 1,1% рослин, максимально - 2%. Розвиток хвороби – 0,5%.