

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 27.11.2025**

Озима пшениця – 3 листки, кушіння. Стан посівів від доброго до задовільного.

Озимий ріпак – утворення листової розетки. Стан посівів від доброго до задовільного.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині переважну частину III декади листопада спостерігалась аномально тепла з мінливою хмарністю погода. В нічні та ранкові години спостерігались тумани з обмеженням видимості до 200-500 м. 21-23 листопада за даними спостережень Агromетеорологічної станції Херсон були зафіксовані температурні рекорди. Середньодобова температура повітря в окремі дні була значно вищою за кліматичну норму, а 22 листопада максимальна температура повітря становила 20,8°C.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліший день до +18-20°C.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч до 4-6°C тепла.

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 20-21°C тепла, в нічні години охолоджувалась до 4-6°C тепла.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила 9-10°C тепла.

Станом на 27 листопада чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 22% обстежених площ, середня чисельність – 1,1 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 3 - 6 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 25% обстежених площ, середня чисельність – 1,1 жила кол./га, максимально – 2 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5 - 7 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 51% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,2 жилих кол./га з 1,5 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 5 жилими норами. Підвищена чисельність гризунів спостерігається на **неугіддях** та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,2, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 2 - 10 штук.

На озимині, розміщеної після стерньових попередників триває шкодочинність личинок **хлібного туруна (жуужелиці)** за середньої чисельності личинок 0,3-0,5 екз/м², максимально 1 екз/м². Заселено 8% обстежених площ. За віковим складом личинки II віку становлять 30%, III – 70%. Подальший розвиток та шкідливість личинок туруна залежатимуть від погодних умов.

Гусениці *озимої совки*, за чисельності 0,5- 1 екз. на кв.м доживляються на 10% обстежених площ посівів озимої пшениці. За віковим складом гусениці V віку становлять 60%, VI – 40%.

Проявлення хвороб на озимих: **борошниста роса** на сходах озимої пшениці уразила 25% обстежених площ, у середньому – 2% рослин, розвиток хвороби – 1,5%; **септоріоз** уразив 12% площ посіву озимої пшениці, у середньому - 1% рослин, з розвитком хвороби - 1%; **бура листкова іржа** уразила 5% площ посіву озимої пшениці, у середньому - 0,5% рослин, з розвитком хвороби - 0,5%; **кореневі гнилі** на посівах озимої пшениці. Уражено 4% площ та 0,3% рослин, розвиток хвороби - 0,3%.

На посівах *озимого ріпаку* гусениці *озимої совки*, за чисельності 0,6- 2 екз. на кв.м доживляються на 35% обстежених площ. За віковим складом гусениці V віку становлять 60%, VI – 40%.

Хвороби озимого ріпаку: **пероноспорозом** уражено 35% обстежених площ, у середньому – 2% рослин, максимально - 4%. Розвиток хвороби – 1,5%; **альтернаріозом** уражено 28% обстежених площ, у середньому – 1,1% рослин, максимально - 2%. Розвиток хвороби – 0,5%.