

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану  
сільськогосподарських рослин в господарствах Херсонської області  
станом на 11.12.2025**

**Озима пшениця** – кущіння. Стан посівів оцінювався як добрий.

**Озимий ріпак** – утворення листової розетки. Стан рослин добрий.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у першій декаді грудня переважала відносно тепла, хмарна, вітряна погода з періодичними опадами у вигляді дощу та туманами, з поступовим похолоданням до кінця декади.

**Максимальна температура повітря** підвищувалась у тепліший день звітного періоду до +5-7°C.

**Мінімальна температура повітря** знижувалась у прохолоднішу ніч звітного періоду до 2-4°C тепла.

**Кількість опадів** випало 5-7 мм.

**Поверхня ґрунту** в денні години нагрівалась до 5-7°C тепла, в нічні години охолоджувалась до 2-4°C тепла.

**Середня відносна вологість повітря** становила 88-94%.

**Вітер** переважав північного та північно - східного напрямку. Максимальна його швидкість досягала 10-12 м/с.

Загалом перша декада грудня була вологою, з температурами повітря вищими за середні кліматичні показники як для цього періоду. Завдяки таким погодним умовам озимі культури продовжували вегетувати, без інтенсивного росту.

Станом на 11 грудня чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 25% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 3-8 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 29% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5-9 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 51% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,2 жила кол./га з 2 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 8 жилими норами. Підвищена чисельність гризунів спостерігається на **неугіддях** та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,3, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 2-10 штук.

На озимині, розміщеної після стерньових попередників триває мляве харчування личинок **хлібного туруна (жуужелиці)** за середньої чисельності личинок 0,3-0,5 екз./м<sup>2</sup>, максимально 1 екз./м<sup>2</sup>. Заселено 8% обстежених площ. За віковим складом личинки II віку становлять 30%, III – 70%.

При проведенні обстежень виявлено незначне збільшення відсотка уражених площ та рослин хворобами: **борошниста роса** на сходах озимої

пшениці уразила 31% обстежених площ, у середньому – 2,5% рослин, розвиток хвороби – 1,5%; **септоріоз** уразив 15% площ посіву озимої пшениці, у середньому – 1,5% рослин, з розвитком хвороби - 1%; **бура листкова іржа** уразила 5% площ посіву озимої пшениці, у середньому - 1% рослин, з розвитком хвороби - 1%; **кореневі гнилі** на посівах озимої пшениці. Уражено 6% площ та 0,5% рослин, розвиток хвороби - 0,5%.

Посіви озимого ріпаку уражено **пероноспорозом** 38% обстежених площ, у середньому – 2,5% рослин, максимально - 4%. Розвиток хвороби – 1,5%; **альтернаріозом** – 28% обстежених площ, у середньому – 1,5% рослин, максимально - 3%. Розвиток хвороби – 1%.