

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 25.12.2025**

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у першій половині третьої декади грудня утримувалась відносно тепла, хмарна з проясненнями погода, без суттєвих опадів. Вночі та вранці спостерігались густі тумани з обмеженням видимості до 200-500 м.

У ніч з 24 на 25 грудня в результаті надходження арктичного повітря з півночі Європи відмічено різке зниження температури повітря.

Середня декадна температура повітря (II декада грудня) становила 3,2-3,6 тепла, що на 3,6-3,9 вище кліматичної норми.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліший день звітного періоду до 6-8°C тепла.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч до 2°C морозу.

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 6-8°C тепла, в нічні години охолоджувалась до 1-2°C морозу.

Середня відносна вологість повітря становила 91-92%.

Вітер переважав північно-західного напрямку, 3-8 м/с.

Агromетеорологічні умови протягом звітного періоду були сприятливими для перезимівлі озимих культур, які перебували у стані неглибокого зимового спокою. Мінімальна температура на глибині залягання вузла кушіння озимої пшениці (3 см) знижувалась до 1-2°C тепла.

Станом на 25 грудня чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 28% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жиля кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5-8 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 32% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жиля кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 6-12 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 56% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жиля кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 10 жилими норами. Підвищена чисельність гризунів спостерігається на **неугіддях** та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5-16 штук.