

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 18.12.2025**

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у другій декаді грудня спостерігалася переважно хмарна погода з температурними коливаннями від морозів уночі до помірного тепла вдень.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліший день звітного періоду до +8-11°C.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч звітного періоду до -2-4°C морозу.

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 5-10°C тепла, в нічні години охолоджувалась до 4-5°C морозу.

Середня відносна вологість повітря становила 88-91%.

У звітному періоді озимі культури перебували у фазі сповільненої вегетації, не перейшовши остаточно у фазу зимового спокою. Тепла погода сприяла повільним ростовим процесам на посівах озимих. Достатнє теплозабезпечення та оптимальне зволоження ґрунту створювало оптимальні умови для укорінення. Посіви озимої пшениці та озимого ріпаку знаходяться у доброму стані.

Станом на 11 грудня чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 26% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 3-8 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 30% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5-10 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 56% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жила кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 10 жилими норами. Підвищена чисельність гризунів спостерігається на **неугіддях** та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 2-10 штук.

За агрокліматичних умов звітного періоду на озимині, розміщеної після стерньових попередників подекуди відмічалось мляве харчування личинок **хлібного туруна (жужелиці)** за середньої чисельності личинок 0,3-0,5 екз./м², максимально 1 екз./м². Заселено 8% обстежених площ. За віковим складом личинки II віку становлять 35%, III – 65%.