

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 02.01.2026**

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у другій половині третьої декади грудня утримувалась морозна та хмарна погода з опадами у вигляді мокрого снігу та ожеледицею.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліший день звітного періоду до 2-3°C тепла.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч до 11°C морозу.

Кількість опадів склала 3-5 мм.

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 1-2°C тепла, в нічні години охолоджувалась до 10-12°C морозу.

Ґрунт на кінець декади був мерзлий.

Сніговий покрив на полях 1-2 см.

Середня відносна вологість повітря становила 78-81%.

Вітер переважав північно - західного та західного напрямку, 7-12 м/с.

Упродовж звітного періоду озимі культури перебували у стані зимового спокою. Мінімальна температура на глибині залягання вузла кушіння озимої пшениці (3 см) знижувалась до 5-8°C морозу, що вище критичної температури вимерзання.

У звітному періоді спостерігалось різке зниження температури повітря, мокрий сніг, ожеледиця, промерзання ґрунту, що негативно вплинуло на розвиток мишоподібних гризунів.

Станом на 02 січня чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 28% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5-8 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 31% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 6-12 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 55% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жила кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 10 жилими норами. Підвищена чисельність гризунів спостерігається на **неугіддях** та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 7-16 штук.