

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 08.01.2026**

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології у першій декаді січня погода на Херсонщині була дуже контрастною: від сильних морозів у перші дні до аномального потепління з 06 січня. Спостерігались опади у вигляді дощу, дощу зі снігом, на дорогах ожеледиця.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліший день звітного періоду (6-7 січня) до 9-12,7° тепла.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч (01 січня) до 9° морозу.

Кількість опадів склала 8 мм (61-65% декадної норми).

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 8-10° тепла, в нічні години охолоджувалась до 9-10° морозу.

Ґрунт на кінець звітного періоду був талий.

Сніговий покрив на полях відсутній.

Середня відносна вологість повітря становила 79-86%.

Вітер переважав південно-західного напрямку, 5-10 м/с. Максимальна його швидкість в окремі дні становила до 18 м/с.

Агromетеорологічні умови протягом декади складались сприятливо для перезимівлі озимих культур, які перебували у стані зимового спокою.

Мінімальна температура на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці (3 см) знижувалась до 2-3° морозу, що значно вище критичної температури вимерзання, яка за розрахунками агromетеорологів становить 16-17° морозу.

У звітному періоді збільшення відсотка заселених площ озимих культур мишоподібними гризунами не виявлено. Скрізь спостерігається зменшення чисельності жилих нір. Розвиток та шкідливість гризунів стримується через перезволоження ґрунту від розтавання снігового покриву, опадів та вологої сирії погоди.

Станом на 08 січня чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 26% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 3-6 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 29% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5-10 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 52% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жила кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 8 жилими норами. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 7-11 штук.