

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 22.01.2026**

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині в середині II декади січня вторинні холодні фронти обумовили невеликий сніг. Утворився сніговий покрив. На кінець декади на дорогах зберігався накат снігу та ожеледиця. Надалі погоду визначав антициклон, утримувалась холодна без опадів погода. Часом вночі та вранці на півночі області спостерігався слабкий туман.

Тривалість сонячного сяйва за даними Агromетеорологічної станції Херсон склала 38 годин.

Середня декадна температура повітря становила 7,9-8,4° морозу, що на 6,9- 7,0° нижче кліматичної норми (1991-2020 рр.)

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліший день звітнього періоду до 0°.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч (17-18 січня) до 14° морозу.

Кількість опадів склала 4-6 мм (40-59% декадної норми).

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 0°, в нічні години охолоджувалась до 16° морозу.

Ґрунт на кінець декади промерз до 21-24 см.

Сніговий покрив на полях залягав суцільним шаром, висота якого на кінець декади, за результатами снігозйомки, становила 3-4 см.

Середня відносна вологість повітря становила 80-87%.

Вітер був північно-східного напрямку. Максимальна швидкість на півночі області становила 13 м/с, на заході області пориви вітру досягали 18 м/с.

Протягом декади озимі культури перебували у стані зимового спокою. Загрозливих явищ для перезимівлі не спостерігалось. Мінімальна температура на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці (3 см) знижувалась до 3-4° морозу, що значно вище критичної температури вимерзання, яка за розрахунками агрометеорологів становить 15-16° морозу.

У звітньому періоді наявність рівномірного снігового покриву на полях під яким достатньо корму для харчування мишоподібних гризунів та відсутність відлиг призвели до незначного збільшення на 10-12% чисельності жилих нір в озимині межуючою з неугіддями. При цьому чисельність жилих колоній залишилась на попередньому рівні.

Станом на 22 січня чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 26% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 4-7 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 29% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 6-11 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах**

заселено 49% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жила кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 8 жилими норами. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 8-12 штук.