

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 29.01.2026**

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології протягом останнього тижня січня на Херсонщині спостерігалась нестабільна погода з поступовим потеплінням, опадами у вигляді снігу та дощу, густими туманами та ожеледицею.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліший день звітного періоду (28 січня) до +6°.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч (23-25 січня) до 5°С морозу.

Кількість опадів склала 2-5 мм (20-40% декадної норми).

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 6° тепла, в нічні години охолоджувалась до 6° морозу.

Ґрунт на кінець звітного періоду почав танути.

Сніговий покрив станом на 28 січня почав сходити з полів, але ще подекуди залишався незначним шаром висотою до 0,5- 1 см.

Середня відносна вологість повітря становила 80-87%.

Вітер був поривчастий північно-східного напрямку, 7-12 м/с.

Протягом декади озимі культури перебували у стані зимового спокою. Загрозливих явищ для перезимівлі не спостерігалось. Мінімальна температура на глибині залягання вузла кушіння озимої пшениці (3 см) знижувалась до 3-4°С морозу, що значно вище критичної температури вимерзання, яка за розрахунками агрометеорологів становить 15-16°С морозу.

Погодні умови звітного періоду були несприятливі для життєдіяльності мишоподібних гризунів. 27-28 січня відмічалось різке підвищення температури повітря, що призвело до танення снігового покриву на сільгоспугіддях і частковому підтопленню житлових нір гризунів. Тому збільшення заселених площ, утворення нових нір та колоній шкідників не виявлено.

Станом на 29 січня чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 24% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жиля кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 4-7 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 27% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жиля кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 6-11 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 46% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жиля кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 8 жилими норами. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 8-12 штук.