

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин в господарствах Херсонської області
станом на 15.01.2026**

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології у першій половині II декади січня на Херсонщині спостерігалась різка зміна погоди: від помірних морозів та сильного вітру на початку звітної періоду до значного зниження температури повітря, особливо вночі. Опади проходили у вигляді снігу, дощу, дощу зі снігом, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці тумани.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліший день звітної періоду (10-11 січня) до 2-5°C тепла.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч (14 січня) до 14°C морозу.

Кількість опадів склала 25-35 мм (228-267% декадної норми).

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 2-4°C тепла, в нічні години охолоджувалась до 9-14°C морозу.

ґрунт промерз до 5-10 см

Сніговий покрив на полях 2-5 см.

Середня відносна вологість повітря становила 84-89%.

Вітер переважав західного напрямку, 7-12 м/с. Максимальна його швидкість в окремі дні становила до 15-20 м/с.

Протягом декади озимі культури перебували у стані зимового спокою. Загрозливих явищ для перезимівлі не спостерігалось.

Мінімальна температура на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці (3 см) знижувалась до 2-3°C морозу, що значно вище критичної температури вимерзання, яка за розрахунками агрометеорологів становить 16-17°C морозу.

У звітному періоді агрокліматичні умови (опади у вигляді снігу, снігу з дощем, хуртовини, ожеледь, налипання мокрого снігу, коливання температури повітря) не сприяли зростанню заселеності та чисельності *мишоподібних гризунів*. Слід зауважити, що на даний час розвиток гризунів проходить під стійким сніговим покривом під яким достатньо корму.

Станом на 15 січня чисельність *мишоподібних гризунів* на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 26% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 3-6 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 29% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5-10 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 53% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жила кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 8 жилими норами. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 7-11 штук.