

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 05.02.2026**

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на початку лютого погода на Херсонщині характеризувалася переходом від нетипового тепла з дощами до поступового похолодання та морозів з опадами у вигляді дощу, льодяного дощу, льодяної крупи, снігу. Утворилась ожеледь діаметром 2-4 мм та сніговий покрив висотою на півночі області 1 см, на заході області 3 см. Через поєднання дощу та льодяного дощу на фоні від'ємної температури повітря, на дорогах посилилася ожеледиця.

Тривалість сонячного сяйва за даними Агromетеорологічної станції Херсон склала 9 годин.

Максимальна температура повітря підвищувалась під час відлиги у тепліші дні (29-30 січня) до 7-9°C тепла.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч (з 01 по 04 лютого) до 12-14°C морозу.

Кількість опадів за III декаду січня склала 22-25 мм (166-210% декадної норми).

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 8-9°C тепла, в нічні години охолоджувалась до 16-18°C морозу.

Ґрунт промерз до 23-29 см, при цьому відтавання на кінець січня становило 9-12 см.

Сніговий покрив висотою на півночі області 1 см, на заході області 3 см.

Середня відносна вологість повітря становила 90-92%.

Вітер був північно-східного напрямку. Максимальна швидкість на півночі області становила 12 м/с, на заході області пориви вітру досягали 16 м/с.

Протягом декади озимі культури перебували у стані зимового спокою. Загрозливих явищ для перезимівлі не спостерігалось. Мінімальна температура на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці (3 см) знижувалась до 2-4°C морозу, що значно вище критичної температури вимерзання, яка за розрахунками агрометеорологів становить 15-16°C морозу.

У звітному періоді коливання температур, підтоплення жилих нір, опади у вигляді снігу, дощу, льодяного дощу, льодяної крупи, снігу, утворення льодяної кірки, ожеледиця не сприяли поширенню та розвитку *мишоподібних гризунів* на полях озимих зернових, ріпаку, багаторічних трав та інших угіддях. Тому збільшення заселених площ, утворення нових нір та колоній шкідників не спостерігається.

Станом на 05 люте чисельність *мишоподібних гризунів* на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 24% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 4-7 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 26% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір

на одну колонію – 6-11 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 43% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жила кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 8 жилими норами. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 8-12 штук.