

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 12.02.2026**

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології у другій половині I декади лютого погоду на Херсонщині визначав антициклон, який приніс у регіон суху, холодну, вітряну погоду, яка сприяла збереженню льодового покриву на дорогах. В окремі дні спостерігались тумани, іній, ожеледиця на дорогах, слабкі зливові опади та мряка.

З 11 лютого розпочався поступовий відступ аномальних морозів.

Тривалість сонячного саява за даними Агromетеорологічної станції Херсон склала 11 годин.

Середня декадна температура повітря була 6,3°C морозу що нижче норми на 4,1°C.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліші дні (07 лютого) до 2,5° тепла.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч (10 лютого) до 14°C морозу.

Кількість опадів за I декаду лютого склала 3,2 мм (29% декадної норми).

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 6,7° тепла, в нічні години охолоджувалась до 14°C морозу.

Ґрунт промерз до 33 см.

Сніговий покрив на кінець звітнього періоду майже зійшов.

Середня відносна вологість повітря становила 50-81%.

Вітер був переважно східного напрямку. Максимальна швидкість становила 12-15 м/с, подекуди пориви до 20 м/с.

Протягом декади озимі культури перебували у стані зимового спокою. Загрозливих явищ для перезимівлі не спостерігалось. Мінімальна температура на глибині залягання вузла куштиння озимої пшениці (3 см) знижувалась до 2-4°C морозу, що значно вище критичної температури вимерзання, яка за розрахунками агрометеорологів становить 15-16°C морозу.

У звітньому періоді різкі коливання температури повітря, утворення льодяної кірки, ожеледиця, в окремі дні танення снігового покриву та затоплення жилих нір (особливо у низинах), сира холодна погода не сприяли поширенню та розвитку *мишоподібних гризунів* на полях озимих зернових, ріпаку, багаторічних трав та інших угіддях. Скрізь відмічається зменшення жилих нір шкідників. Загибель у середньому становить 5-9%.

Станом на 12 лютого чисельність *мишоподібних гризунів* на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 22% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 3-6 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 25% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5-10 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах**

заселено 41% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жила кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 8 жилими норами. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 8-12 штук.