

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області
станом на 26.02.2026**

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології у першій половині III декади лютого спостерігалася мінлива погода з переходом від сухих сонячних днів до опадів у вигляді дощу та мокрого снігу, спричинених впливом циклону.

Тривалість сонячного сяйва за даними Агromетеорологічної станції Херсон склала 17 годин.

Середня декадна температура повітря становила 0,4-0,9° тепла, що на 1,6°C вище кліматичної норми (1991-2020 рр.).

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліші дні до 5-6°C тепла.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч до 3-4°C морозу.

Кількість опадів за II декаду лютого склала 19-30 мм (168-253% декадної норми).

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до 6°C тепла, в нічні години охолоджувалась до 4°C морозу.

Ґрунт у звітному періоді був майже талий.

Сніговий покрив відсутній.

Середня відносна вологість повітря становила 86-90%.

Вітер був переважно південно-західного напрямку, максимальна швидкість становила 7-12 м/с, з максимальною швидкістю вітру 15 м/с та більше нараховувалось 1-2 дні.

Протягом звітного періоду озимі культури перебували у стані зимового спокою. Загрозливих явищ для перезимівлі не спостерігалось. 13-14 лютого агрометеорологами області були взяті з полів зразки озимої пшениці та озимого ріпаку для визначення життєздатності. За результатами відрощування загибелі у зразках виявлено не було.

Мінімальна температура на глибині залягання вузла куштиння озимої пшениці (3 см) знижувалась до 4°C морозу, що вище критичної температури вимерзання, яка за розрахунками агрометеорологів становить 16-18°C морозу.

Протягом звітного періоду утримувались несприятливі погодні умови (опаді у вигляді дощу, мокрого снігу, мряка, застоювання талої води на полях) для життєдіяльності мишоподібних гризунів. При обстеженні сільгоспугідь заселення нових площ гризунами не виявлено. Загибель нір шкідників внаслідок погодних умов, зокрема затоплення нір талими водами, становить від 5% до 20% (у низинах).

Станом на 26 лютого чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 21% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жиля кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 3-5 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого**

ріпаку мишоподібними гризунами заселено 24% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 5-9 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 36% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жила кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3 жилих кол./га з 7 жилими норами. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 7-10 штук.