

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану  
сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області  
станом на 13.03.2026 року**

**Озима пшениця** – кущіння.

**Озимий ріпак** – утворення листової розетки.

**Плодові дерева:** вишня – початок набухання бруньок.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у другій половині I декади березня теплу, сонячну погоду без опадів обумовив антициклон.

**Тривалість сонячного саява** за даними Агromетеорологічної станції Херсон склала 71 годину.

**Середня декадна температура повітря** становила 4,2-4,4° тепла, що на 1,4- 2,0° вище кліматичної норми (1991-2020 рр.).

**Максимальна температура повітря** підвищувалась у тепліший день декади (10 березня) до 16-17° тепла.

**Мінімальна температура повітря** знижувалась у холодніші ночі декади (07 березня) до 1-2° морозу.

**Кількість опадів** які спостерігались у вигляді слабких дощів, склала 0,0-0,1 мм.

**Поверхня ґрунту** в денні години нагрівалась до 28° тепла, в нічні години охолоджувалась до 4° морозу.

**Ґрунт** на кінець звітнього періоду був талий.

Сніговий покрив на кінець декади був відсутній.

**Середня відносна вологість повітря** становила 71-72%.

**Вітер** переважав північно-західного напрямку. Максимальна швидкість досягала на півночі області 11 м/с, на заході області 06 березня пориви північного вітру досягали 16 м/с.

Завдяки підвищенню температури повітря **04-06 березня** у озимих культур відмічалось відновлення вегетації, що на 9-10 днів раніше багаторічних строків.

Мінімальна температура на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці (3 см) знижувалась до 0°С, що значно вище критичної температури вимерзання, яка за розрахунками агromетеорологів становить 15-17°С морозу.

Погодні умови першої декади березня сприяли життєдіяльності шкідників. Виявлено незначне збільшення житлових нір на сільськогосподарських угіддях.

Станом на 12 березня чисельність **мишоподібних гризунів** на обстежуваних посівах **озимих зернових** становила 19% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 2 жилих кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 3-8 штук (на крайових смугах). В посівах **озимого ріпаку** мишоподібними гризунами заселено 22% обстежених площ, середня чисельність – 1,2 жила кол./га, максимально – 3 кол./га з чисельністю жилих нір на одну колонію – 7-14 штук (на крайових смугах). В **багаторічних травах** заселено 33% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників – 1,4 жила кол./га з 3 жилими норами, максимально – 3

жилих кол./га з 10 жилими норами. У лісосмугах, на неугіддях та на полях, де не проводився післязбиральний обробіток ґрунту обліковують 2,4, максимально 4 жилих колоній на гектарі з чисельністю жилих нір на одну колонію – 10-14 штук.

У південній та центральній частині області наростання середньодобових температур повітря сприяло переміщенню у верхні шари ґрунту та початок живлення личинок **хлібного туруна (жужелиці)** на посівах, посіяних по стерньовим попередниках. Чисельність фітофага коливається в допороговій чисельності від 0,1 до 0,3 екз./м<sup>2</sup>. Шкідник знаходиться переважно в другому та третьому віці (35-65%), тому період пошкодження посівів личинками триватиме.

Погодні умови з підвищенням температури повітря та відсутністю опадів сприяли пробудженню та виходу з місць зимівлі **імаго великого ріпакового прихованохоботника**.