

**Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану
сільськогосподарських рослин в господарствах Херсонської області
станом на 07.08.2026**

Соняшник – налиव насіння, кінець цвітіння. Діаметр кошику в середньому становить 12 см. Висота рослин 135 см. Стан посівів добрий.

Кукурудза – молочна, воскова стиглість.

Овочеві – томати: посівні – зелена, повна стиглість, *розсадні* – повна стиглість; *капуста* – збирання; *кавун* – збирання, досягання плодів.

Плодові дерева – досягання плодів.

Виноград – плодоутворення.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології у першій половині I декади серпня на Херсонщині переважала суха, малохмарна та спекотна погода, зумовлена надходженням гарячих повітряних мас із північних районів Африки. Протягом цього періоду спостерігалось поступове підвищення температури повітря до екстремальних показників.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліші дні до 36-37° тепла.

Мінімальна температура повітря знижувалась у холодніші ночі до +15-16° тепла.

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до +60-66°, в нічні години охолоджувалась до +15-16°.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила +29-32°.

Кількість опадів. Місцями пройшов невеликий короткочасний дощ із грозою.

Вітер упродовж звітного періоду був північно-східного напрямку, 7-12 м/с.

Агрометеорологічні умови протягом декади для росту, розвитку та формування урожаю пізніх теплолюбних культур ускладнювались відсутністю продуктивних опадів та дефіцитом вологи в ґрунті. Для досягання та збирання достиглих плодів овочевих та баштанних культур умови складались добре.

Багатоїдні шкідники

У місцях резервації (*неорні землі, балки, узбіччя доріг, пасовища*) продовжують свій розвиток стадні та нестадні види **саранових**. Триває парування шкідника, розпочалося відкладання яєць, яке буде розтягнуте в часі.

Стадні види (*італійський прус, перелітна сарана*) відмічають за середньої чисельності 0,5-2,0 екз./м². Середня чисельність саранових **нестадних** видів становить 0,5-3,0 екз./м², максимально 5 екз./м². За видовим складом переважають: кобилки блакитнокрила, темнокрила, чорносмугаста, хрестовичка мала.

Також повідомляємо, що на території Нововоронцовської селищної територіальної громади завершено дію особливого режиму захисту рослин, який було запроваджено через появу небезпечного шкідника – сарани перелітної.

Продовжується розвиток *лучного метелика* II покоління. Перевищення економічного порогу шкодочинності та пошкоджень сільськогосподарських культур не відмічено. Середня чисельність гусениць на крайових смугах обстежених площ посівів соняшнику, кукурудзи та багаторічних трав складає 0,5-1,2 екз./м², максимальна 2,0 екз./м².

В посівах просапних та овочевих культур триває живлення гусениць різних віків листогризух совок другого покоління. Гусеницями совок заселено від 15% до 40% обстежуваних площ посівів кукурудзи, соняшника та томатів, середня чисельність гусениць складає 0,5-1,5 екз./рослину, максимально 2,0 екз./рослину, пошкоджено від 5% до 10% рослин в слабкому та середньому ступені.

Триває літ *озимої совки* другого покоління. Середня чисельність метеликів на світлові пастки коливається від 1 до 2 екз. на світло пастку за ніч. Гідротермічні умови у даний період не сприяють розвитку шкідника.

У посівах кукурудзи триває розвиток та живлення гусениць *стеблового (кукурудзяного) метелика*. Шкідником заселено до 30% площ, до 1,5-3% рослин, пошкоджено від 1,5% до 3% рослин. Чисельність гусениць середня - середня - 0,7-0,9 екз./рослину, максимальна 1,0 екз./рослину.

Шкідники зернових колосових

Продовжується переліт *клопів шкідливої черепашки* у лісосмуги на місця зимівлі. За попередніми даними перелетіло 35% клопів, чисельність становить - 0,3 - 1,0 екз./м².

Шкідники та хвороби кукурудзи

Попелиць виявлено на 35% обстежених площ посівів кукурудзи, заселено 2,5% рослин, середня чисельність – 2 екз./росл., максимально – 1 колонія.

Продовжується харчування гусениць різних віків *бавовникової та інших листогризух совок* II покоління, заселено до 25% обстежених площ, за середньої чисельності – 1,1 гус./рослину, максимально 2,0 гус./рослину, при заселенні в середньому – 5-10 % рослин.

Живлення гусениць *стеблового кукурудзяного метелика* спостерігається на 30% обстеженої площі, заселено в середньому 3% рослин. Чисельність личинки склала 0,9 екз./рослину.

Пухирчастою сажкою уражено 3% площ посіву кукурудзи, у середньому - 0,2% рослин. Розвиток хвороби – 2%.

Шкідники та хвороби соняшнику

На рослинах соняшнику, за чисельності 1 колонія на гектар, продовжують шкодити *геліхризіві попелиці*, якими заселено та пошкоджено від 5% до 10% рослин, на 43% обстежуваних площ.

Заселено 12% площ посівів та 2% рослин соняшнику, за середньої чисельності 3 екз./лист.

Гусеницями *соняшникової вогнівки* 3-5 віку заселено до 8% обстежених площ, заселено до 4% рослин, середня чисельність 0,6 гусінь на рослину, максимально 1,0 гус./рослину.

Гусениць *бавовникової совки* виявлено на 25% обстежених площ посівів соняшнику, у середньому - 1% рослин, максимально - 2%, середня чисельність - 1 гус./роsl.

Несправжньою борошнистою росою (пероноспорозом) уражено до 5% рослин на 10% обстежуваних площ, розвиток хвороби 1%.

Альтернاریоз виявлено на 25% площ. Уражено у середньому 1,5%, максимально - 3% рослин, з розвитком хвороби - 1%.

Фомозом уражено 15% обстежених площ посівів, у середньому - 1% рослин, максимально - 2%, розвиток хвороби – 1%.

Шкідники та хвороби овочевих культур

Капусту на 50% обстежених площ, на 15% рослин заселяють та пошкоджують *гусениці совок, біланів, капустяної молі та попелиці*.

Попелицями заселено від 10 до 15% рослин. Чисельність складає 1-2 колонії на рослину.

Капустяною міллю заселено 1–5% рослин з чисельністю 2–4 гусениць на рослину.

Гусеницями *капустяного білана та капустяної совки* другого покоління, заселено до 5% рослин, 40% площ, середня чисельність 1,0 гусениць/рослину, максимально 2,0 гусениць/рослину.

Білокрилкою заселено до 35% обстежених площ капусти, у середньому – 3% рослин, максимально 5% рослин, за середньої чисельності 5 екз./роsl., максимально – 15 екз./роsl.

На *баштанних культурах* триває живлення *трипсів та попелиць*, середня чисельність 3,0 екз/рослину, максимально до 5,0 екз/рослину, пошкоджено 2-5% рослин. 5% рослин баштанних культур на 10% обстежених площ заселені *звичайним павутинним кліщем*.

Фітофторозом та альтернاریозом уражено 25% обстежених площ картоплі та томатів, у середньому - 1% рослин, максимально - 3%, розвиток хвороби – 1,5%.

Верхівкову гниль виявлено на 25% площ томатів, уражено у середньому 1,5% рослин та 3% плодів. Розвиток хвороби – 2%.

Рослини баштанних культур уражені **антракнозом** на 15% обстеженої площі, уражено 3% рослин в слабкому ступені.

Скрізь у приватному секторі томати за чисельності 0,5-0,7 екз/м² пошкоджують гусениці *совок (городньої, бавовникової, карадрини)*.

Шкідники та хвороби плодових культур

Триває розвиток та харчування II покоління *яблуневої плодожерки*. Шкідника виявлено на 55% дерев, в залежності від саду і системи захисту. Гусеницями яблуневої плодожерки пошкоджено 1–5% плодів на деревах із 1 гус./плід. Спостерігаються гусениці 2- 4 віків.

Триває живлення гусениць *сливової плодожерки* II покоління. Пошкоджені плоди виявлено на 15% дерев, пошкоджено 1–7% плодів на деревах.

Триває шкодочинність личинок *каліфорнійської щитівки* II покоління. Заселено 30% дерев за середньої чисельності 0,1 лич./п.м.г., максимально – 1. Пошкоджено у середньому 2% плодів, максимально – 5%.

У плодкових садах триває шкодочинність личинок кліщів: червоного плодового, бурого та глодового. У незахищених садах приватного сектору кліщами заселено до 60% дерев. Середня чисельність становить: червоного -2,3 екз./лист, бурого - 1,2 екз./лист, глодового - 1,0 екз./лист. Пошкоджено у середньому 5% листя, максимально – 10%.

Триває шкодочинність *попелиць*. *Зеленою яблуневою попелицею* заселено 70% дерев. Личинки пошкодили у середньому 5% листя, максимально - 10%, середня чисельність - 1 кол./лист, максимально -2. Личинки *вишневої попелиці* шкодять на 75% дерев. Заселено та пошкоджено 5% листя, максимально – 12%, середня чисельність - 1 кол./лист, максимально -2. *Сливова попелиця* заселила 42% дерев, у середньому - 10% листя, максимально - 17%, середня чисельність - 1 кол./лист, максимально - 2.

Моніліоз кісточкових виявлений на абрикосі, вишні, черешні. Уражено у середньому 15% дерев та 3% молодих пагонів із розвитком хвороби -3%.

Парша яблуні виявлена на 10% дерев. У середньому уражено 2% листя, максимально – 4, розвиток хвороби – 2%.

Парша груші виявлена на 15% дерев. У середньому уражено 2% листя, максимально – 5, розвиток хвороби – 2%.

Кокомікозом уражено 4% дерев черешні, у середньому - 3% листя, максимально - 5%. Розвиток хвороби – 2%.

Шкідники та хвороби винограду

В виноградниках продовжують шкодити гусениці *гронової листокрутки і кліщі (павутинний, виноградний зудень)*.

Виноградний зудень заселив до 25% обстежених площ і до 5% кущів та 1-10% листя, чисельність становить 1, максимально – 3 екз./кущ, особливо у приватному секторі.

Продовжується розвиток і живлення гусениць *гронової листокрутки* другого покоління, які на 0,1–1,0% кущів пошкодили 0,10–0,20% грон. Чисельність гусениць становить 1,0 екз. на кущ.

У занедбаних та загущених виноградних насадженнях, де не проводились обробки фунгіцидами продовжується ураження рослин **мілдью і оїдіумом**. **Мілдью** уражено 2-5%, максимально 10% кущів, до 10% листків. **Оїдіумом** уражено до 5–10%, подекуди в осередках до 15% кущів, 1–4% листя, 3-5% грон.