Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин в господарствах Херсонської області станом на 21.08.2026

Соняшник – налив насіння. Діаметр кошику в середньому становить 17 см. Середня висота рослин 136 см. Стан посівів добрий.

Кукурудза – молочна, воскова, повна стиглість.

Овочеві – *томати: посівні* – зелена, повна стиглість, *розсадні* – повна стиглість; *капуста* – збирання; *кавун* – збирання, достигання плодів.

Плодові дерева – достигання плодів.

Виноград – плодоутворення

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у звітному періоді переважала суха та сонячна погода з мінливою хмарністю. Температура вночі складала +11°…+19°С, а вдень повітря прогрівалося до +25°…+33°С. Істотних опадів не спостерігалося, тривала ґрунтова посуха.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліші дні до 30-33° тепла.

Мінімальна температура повітря знижувалась у холодніші ночі до +11-12° тепла.

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до +50-53°, в нічні години охолоджувалась до +11-12°.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила +25°.

Кількість опадів. Місцями вночі 19 серпня пройшов невеликий короткочасний дощ із грозою, 0,0-0,1 мм (0-1% декадної норми).

Вітер переважав північно-західний та північно-східний, 7–12 м/с.

Агрометеорологічні умови протягом звітного періоду ускладнювались відсутністю опадів на фоні підвищених температур повітря, низької вологості та суховійних явищ. Ґрунтова та повітряна посуха поширювалась та поглиблювалась. Для достигання та збирання достиглих плодів овочевих та баштанних культур умови складались задовільно.

Багатоїдні шкідники

Триває доживлення, парування та відкладання яєць у ворочки ***саранових***. Заселено 100% обстежених площ місць резервації (неорні землі, балки, пасовища). Стадні види (***італійський прус, перелітна сарана***) відмічають за середньої чисельності 0,5-2,0 екз./м^2. Середня чисельність саранових ***нестадних*** видів становить 0,5-3,0 екз./м^2, максимально 5 екз./м^2.

Продовжується розвток ***лучного метелика*** II покоління. Перевищення економічного порогу шкодочинності та пошкоджень сільськогосподарських культур не відмічено. Середня чисельність гусениць на крайових смугах обстежених площ посівів соняшнику, кукурудзи та багаторічних трав складає 0,5-1,2 екз./м^2, максимальна 2,0 екз./м^2.

В посівах просапних та овочевих культур триває живлення гусениць різних віків листогризучих совок другого покоління. Гусеницями совок заселено від

15% до 40% обстежуваних площ посівів кукурудзи, соняшника та томатів, середня чисельність гусениць складає 0,5-1,5 екз./рослину, максимально 2,0 екз./рослину, пошкоджено від 5% до 10% рослин в слабкому та середньому ступені.

Продовжується літ, яйцекладка, відродження гусениць ***озимої совки*** II покоління та інших підгризаючих совок (окличної). Середня чисельність метеликів на світлові пастки коливається від 1 до 2 екз. на світло пастку за ніч. Гусениці ***озимої совки*** другого покоління за чисельності 0,6 екз. на кв. метр виявлені на парових полях, стерні злакових та просапних культурах.

У посівах кукурудзи закінчується розвиток і живлення гусениць ***стеблового (кукурудзяного) метелика*** I покоління. Шкідником заселено до 30% площ та до 3% рослин, пошкоджено від 1,5% до 3% рослин. Чисельність гусениць середня - 0,7-0,9 екз./рослину максимальна 1,0 екз./рослину.

Одночасно продовжується слабкий літ стеблового (кукурудзяного) метелика літнього покоління.

На стерні зернових колосових культур з країв полів спостерігається живлення ***мишоподібних гризунів***, чисельністю 0,5-1 колоній на гектар.

Шкідники та хвороби кукурудзи

Продовжується харчування гусениць різних віків ***бавовникової та інших листогризучих совок*** II покоління на качанах кукурудзи, заселено до 25% обстежених площ, за середньої чисельності – 1,1 гус./рослину, максимально 2,0 гус./рослину, при заселенні в середньому –5-10 % рослин.

Живлення гусениць ***стеблового кукурудзяного метелика*** спостерігається на 30% обстеженої площі, пошкоджено 3% рослин та 2% качанів у слабкому ступені. Чисельність личинки склала 0,9 екз./рослину.

Пухирчастою сажкою уражено 3% площ посіву кукурудзи, у середньому - 0,2% рослин. Розвиток хвороби – 2%.

Летюча сажка Хворобу виявлено на 1% обстежених площ, уражено поодинокі рослини, розвиток хвороби – 2%.

Шкідники та хвороби соняшнику

На рослинах соняшнику, за чисельності 1 колонія на гектар, продовжують шкодити ***геліхризові попелиці,*** якими заселено та пошкоджено від 5% до 10% рослин, на 43% обстежуваних площ.

Спекотна, суха погода сприяє активності ***павутинного кліща*** на рослинах соняшнику. Заселено 15% площ посівів та 2% рослин соняшнику, за середньої чисельності 3 екз./лист, максимально 7 екз./лист.

Гусениць ***бавовникової совки*** виявлено на 25% обстежених площ посівів соняшнику, у середньому - 1% рослин, максимально - 2%, середня чисельність - 1 гус./росл.

Несправжньою борошнистою росою (пероноспорозом) уражено до 5% рослин на 10% обстежуваних площ, розвиток хвороби 1%.

Альтернаріоз хворобу виявлено на 25% площ. Уражено у середньому 1,5%, максимально - 3% рослин, з розвитком хвороби - 1%.

Фомозом уражено 15% обстежених площ посівів, у середньому - 1% рослин, максимально - 2%, розвиток хвороби – 1%.

Шкідники та хвороби овочевих культур

Капусту на 50% обстежених площ, на 15% рослин заселяють та пошкоджують ***гусениці совок, біланів, капустяної молі та попелиці.***

Попелицями заселено від 10 до 15% рослин. Чисельність складає 1-2 колонії на рослину.

Капустяною міллю заселено 1–5% рослин з чисельністю 2–4 гусениць на рослину.

Гусеницями ***капустяного білана та капустяної совки*** другого покоління, заселено до 5% рослин, 40% площ, середня чисельність 1,0 гусениць/рослину, максимально 2,0 гусениць/рослину.

Білокрилкою заселено до 55% обстежених площ капусти, у середньому – 3% рослин, максимально 5% рослин, за середньої чисельності 5 екз./росл., максимально – 15 екз./росл.

На ***баштанних культурах*** триває живлення ***трипсів*** та ***попелиць***, середня чисельність 3,0 екз/рослину, максимально до 5,0 екз/рослину, пошкоджено 2-5% рослин. 5% рослин баштанних культур на 10% обстежених площ заселені ***звичайним павутинним кліщем.***

Фітофторозом та альтернаріозом уражено 25% обстежених площ картоплі та томатів, у середньому - 1% рослин, максимально - 3%, розвиток хвороби – 1,5%.

Верхівкову гниль виявлено на 25% площ томатів, уражено у середньому 1,5% рослин та 3% плодів. Розвиток хвороби – 2%.

Рослини баштанних культур уражені **антракнозом** на 15% обстеженої площі, уражено 3% рослин в слабкому ступені.

Бактеріоз на огірках уразив 3% рослин, у середньому – 5% листя, розвиток хвороби - 2,5%.

Скрізь у приватному секторі томати за чисельності 0,5-0,7 екз/м^2 пошкоджують гусениці ***совок (городньої, бавовникової, карадрини)***.

Шкідники та хвороби плодових культур

В яблуневих садах закінчується живлення ***яблуневої плодожерки*** II покоління. Шкідника виявлено на 55% дерев, в залежності від саду і системи захисту. Гусеницями шкідника пошкоджено 2–7% плодів на деревах із 1 гус./плід. Розпочалось заляльковування гусениць яблуневої плодожерки.

Закінчується живлення гусениць ***сливової плодожерки*** II покоління. Триває заляльковування гусениць шкідника. Пошкоджені плоди виявлено на 15% дерев, пошкоджено 1–7% плодів на деревах.

У плодових садах триває шкодочинність личинок кліщів: червоного плодового, бурого та глодового. У незахищених садах приватного сектору кліщами заселено до 60% дерев. Середня чисельність становить: червоного -2,3 екз./лист, бурого - 1,2 екз./лист, глодового - 1,0 екз./лист. Пошкоджено у середньому 5% листя, максимально – 10%.

Триває шкодочинність ***попелиць. Зеленою яблуневою попелицею*** заселено 70% дерев. Личинки пошкодили у середньому 5% листя, максимально - 10%, середня чисельність - 1 кол./лист, максимально -2. Личинки ***вишневої попелиці*** шкодять на 75% дерев. Заселено та пошкоджено 5% листя, максимально – 12%, середня чисельність - 1 кол./лист, максимально -2. ***Сливова попелиця*** заселила 42% дерев, у середньому - 10% листя, максимально - 17%, середня чисельність - 1 кол./лист, максимально - 2.

Моніліоз кісточкових виявлений на абрикосі, вишні, черешні. Уражено у середньому 15% дерев та 3% молодих пагонів із розвитком хвороби -3%.

Прояви **парші яблуні** виявлено на 10% дерев. У середньому уражено 2% листя, максимально – 4, розвиток хвороби – 2%.

Прояви **парші груші** виявлено на 15% дерев. У середньому уражено 2% листя, максимально – 5, розвиток хвороби – 2%.

Кокомікозом уражено 10% дерев черешні, у середньому - 5% листя, максимально - 10%. Розвиток хвороби – 3%.

Плодова гниль на яблуні виявлена на плодах яблуні. Уражено 3% дерев, плодів уражено у середньому 1,5%, максимально - 3%, розвиток хвороби -2%.

Шкідники та хвороби винограду

В виноградниках продовжують шкодити гусениці ***гронової листокрутки і кліщі (павутинний, виноградний зудень).***

Виноградний зудень заселив до 25% обстежених площ і до 5% кущів та 1-10% листя, чисельність становить 1, максимально – 3 екз./кущ, особливо у приватному секторі.

Продовжується розвиток і живлення гусениць ***гронової листокрутки*** другого покоління, які на 0,1–1,0% кущів пошкодили 0,10–0,20% грон. Чисельність гусениць становить 1,0 екз. на кущ.

У занедбаних та загущених виноградних насадженнях, де не проводились обробки фунгіцидами продовжується ураження рослин **мілдью і оїдіумом. Мілдью** уражено 2-5%, максимально 10% кущів, до 10% листків. **Оїдіумом** уражено до 5–10%, подекуди в осередках до 15% кущів, 1–4% листя, 3-8% грон.