Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин в господарствах Херсонської області станом на 25.09.2026

Озима пшениця – сівба.
Озимий ріпак – сівба, сходи.
Соняшник – збирання.
Кукурудза – повна стиглість, збирання.
Овочеві: *томати посівні* – повна стиглість.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині теплу суху погоду більшої частини звітного періоду обумовлювало поле підвищеного тиску. При проходженні територією області циклону, 22-23 вересня пройшли дощі.

Тривалість сонячного сяйва за даними Агрометеорологічної станції Херсон склала 83 години, що на 1 годину більше норми.

Середня декадна температура повітря становила +18,8-19,0℃, що на 1,2-1,6℃ вище кліматичної норми (1991-2020 рр.).

Максимальна температура повітря підвищувалась у найтепліші дні до+26-27℃.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч до +8-9℃.

Кількість опадів склала 6-8 мм (58-87% декадної норми).

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до +50-51℃, в нічні години охолоджувалась до +7-8℃.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила +20-21℃.

Середній дефіцит вологості повітря склав 7 мм (норма 6 мм).

Середня відносна вологість повітря становила 64-68%. Упродовж 2-3 днів відносна вологість повітря в денні години знижувалась до 30% та нижче. Із суховіями на півночі області відмічалось 2 дні.

Вітер був змінних напрямків. Максимальна його швидкість досягала 10-13 м/с.

Агрометеорологічні умови протягом звітного періоду складались цілком сприятливо для проведення сівби озимої пшениці та озимого ріпаку врожаю 2027 року. Але через недостатню кількість опадів зволоження грунту залишалось на низькому рівні, що може ускладнювати проростання та появу сходів вже посіяних озимих кіультур. Для достигання та збирання врожаю пізніх теплолюбивих та овочевих культур умови були сприятливі.

Багатоїдні шкідники

Мишоподібні гризуни за чисельності 0,5-1,0, макс. 2,0 жилих колонії на гектар, продовжують зосереджуватися в місцях резервацій (неорні землі, неугіддя, лісосмуги, сади, пасовища) та на полях після збирання соняшнику,

овочевих культурах та багаторічних травах. Чисельність їх поступово збільшується.

На неугіддях продовжується поодиноке живлення гусениць ***лучного метелика*** III покоління. Середня чисельність гусениць 0,5 екз./м^2.

У пізніх посівах томатів, перцю, капусти, кукурудзи, багаторічних трав триває харчування гусениць III покоління листогризучих совок – ***бавовникової***, ***помідорної (карадрини)***, ***совки гамми*** та та інших совок, які знаходяться переважно в 2-5 віці. Совками заселено до 30% обстежених площ овочевих культур, пошкоджено 5-10% рослин, середня чисельність шкідника складає 1,5 екз./рослину, максимально 2,0 екз/рослину.

Триває харчування на бур'янах, на овочевих та просапних культурах гусениць ***озимої совки*** II покоління. Чисельність гусениць 0,5- 1,1 екз/м^2, максимально - 2 екз/м^2 (2 віку - 25%, 3 віку - 55%, 4 віку -20%). Заселено 25% обстежених площ.

Шкідники озимого ріпаку

На сходах озимого ріпаку у сонячну, жарку погоду відмічено шкодочинність ***хрестоцвітих блішок***, чисельність яких становить – 0,5-3,0 екз/м^2, пошкоджено до 2% рослин в слабкому ступені, площа заселення – 50%.

Шкідники озимих зернових культур

На сходах падалиці продовжується розвиток ***хлібного туруна (жужелиці)*** за середньої чисельності імаго 0,5-1,0 екз/м^2, максимально 3,0 екз/м^2. Відмічено початок відродження личинок, чисельність личинки першого віку 0,2-0,3 екз/м^2.

У теплу сонячну погоду на сходах падалиці озимої пшениці спостерігався літ ***злакових мух,*** шкодочинність ***попелиць*** та ***цикадок.***

Клоп-шкідлива черепашка перебуває у місцях зимівлі (лісосмуги), де його чисельність складає 0,5-0,8 максимально 3,0 екз/м^2, при заселенні 35% обстеженої площі.

Шкідники та хвороби кукурудзи

У посівах кукурудзи пізніх строків посіву продовжується харчування гусениць ***бавовникової та інших совок***, які за чисельності 1-2 екз. на рослину пошкодили 1-2, осередково до 3% качанів у слабкому ступені.

Спостерігається незначне поширення хвороб кукурудзи. **Пухирчастою сажкою** уражено 3% площ посіву кукурудзи, у середньому - 0,2% рослин. Розвиток хвороби – 2%.

Летючу сажку виявлено на 1% обстежених площ, уражено поодинокі рослини, розвиток хвороби – 2%.

Шкідники та хвороби соняшнику

Подекуди в пізніх посівах соняшнику продовжують шкодити ***гусениці бавовникової, гамми та інших совок***, середня чисельність яких 0,5-1,0 екз. на рослину, максимально 2,0 екз/рослину. Вони заселили до 25% обстежуваних площ, пошкодивши до 2-5% рослин.

На пізніх посівах, переважно листках верхнього ярусу, виявлено **фомоз**, **септоріоз**, **іржу,** якими уражено в слабкому ступені до 3% рослин.

Шкідники та хвороби овочевих культур

На пізніх посадках ***овочевих культур*** в приватному секторі триває харчування гусениць ***помідорної*** та ***бавовникової*** совок ІІІ покоління. Гусениці пошкодили 1-5% плодів, середня чисельність бавовникової совки становить 1,2 екз./рослину, карадрини – 0,5 екз./рослину.

Погодні умови (коливання температур, тумани, випадання опадів) сприяли ураженню пізніх сортів томатів фітофторозом, макроспоріозом. **Фітофторозом** уражено до 15% рослин на 50% площ, розвиток хвороби 2,5%, **альтернаріозом та макроспоріозом** уражено 5% рослин на 25% площ.

На незахищених площах ***пізньої капусти*** шкодять гусениці капустяної ***совки*** (1,0 екз/рослину), гусениці ***біланів*** (1,3 екз/рослину), ***молей*** (2-5 екз/рослину).

Повсюди огірки другого строку висіву в приватному секторі хворіють на **бактеріоз, пероноспороз, антракноз. Бактеріозом** уражено від 1% до 3% рослин, **пероноспорозом** – до 3% рослин, **антракнозом** – до 10% рослин, на 10-35% площ.

Шкідники та хвороби плодових культур

Гусениці ***яблуневої плодожерки*** ІІІ покоління закінчують живлення та розпочинається їхнє переміщення у місця зимівлі – під відсталу кору дерев, грудочки землі навколо дерева. Пошкоджено від 1 до 5% плодів.

Прояви **парші яблуні** виявлено на 15% дерев. У середньому уражено 5% листя, максимально – 10, розвиток хвороби – 3%.

Прояви **парші груші** виявлено на 20% дерев. У середньому уражено 5% листя, максимально 10, розвиток хвороби – 3%.

Плодова гниль на яблуні виявлена на плодах яблуні. Уражено 3% дерев, плодів уражено у середньому 1,5%, максимально - 3%, розвиток хвороби -2,5%.