Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин у господарствах Херсонської області станом на 30.10.2026

Озима пшениця – в залежності від строків сівби відмічались сходи, утворення вузлових коренів та 3-й листок. Стан посівів добрий.

Озимий ячмінь – сівба, проростання зерна та сходи.

Озимий ріпак – утворення листової розетки. На 1м^2 нараховувалось від 102 до 135 рослин. Стан посівів добрий.

Плодові дерева – осіннє забарвлення листя та початок листопада.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у ІІІ декаді жовтня спостерігалася переважно хмарна з проясненнями осіння погода з періодичними невеликими дощами та поступовим зниженням температури повітря.

Тривалість сонячного сяйва за даними Агрометеорологічної станції Херсон склала 16 годин, що на 36 годин менше за норму.

Середня декадна температура повітря становила +13,6-13,9°, що на 2,5-3,4° вище кліматичної норми (1991-2020 рр.).

Максимальна температура повітря підвищувалась у найтепліші дні до+20℃.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч до +5-6℃.

Поверхня грунту в денні години нагрівалась до +38-42°, в нічні години охолоджувалась до +3-6°.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила +15°.

Середня відносна вологість повітря становила 86-89%, середній дефіцит вологості повітря за декаду - 2 мм (норма 3 мм).

Кількість опадів за ІІ декаду жовтня склала 25-28 мм (190-200% декадної норми).

Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Агрометеорологічні умови протягом декади складались сприятливо. Теплий температурний режим та достатнє зволоження ґрунту позитивно позначилось на укоріненні та початковому розвитку озимих культур.

Багатоїдні шкідники

Триває подальше заселення ***мишоподібними гризунами*** сільськогосподарських угідь та неорних земель. Спостерігається незначне збільшення чисельності житлових нір гризунів та їх поширення в агроценозах.

Триває розселення гризунів у середину полів ***озимих зернових та ріпаку***. На посівах озимої пшениці гризунів виявлено на 7% обстежених площ посівів, середня чисельність - 1 кол./га з 1,2 житлової нори, максимально - 2 кол./га з 3 житловими норами.

На посівах озимого ріпаку шкідниками заселено 10% обстежених площ посівів, середня чисельність - поодинокі колонії з 1,2 житлової нори, максимально – 1 кол. з 3 житловими норами.

На неорних землях **(**неугіддях, лісосмугах, на полях після збирання соняшнику, кукурудзи) ***мишоподібних гризунів*** виявлено за середньої чисельності 2,1-4,0 жилих кол/га, з чисельністю жилих нір 10-20 шт./га. Заселено 100% обстежених площ.

На багаторічних травах заселено 50% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників - 1 кол./га з 2 жилими норами, максимально - 2 кол./га з 4 жилими норами.

На посівах озимих культур триває шкодочинність гусениць ***озимої совки*** II покоління. Заселено 35% посівів озимого ріпаку та 10% посівів озимої пшениці, середня чисельність - 0,5 - 1,1 екз/м^2, максимально - 2 екз/м^2. За віковим складом гусениці IV віку -30%, V - 55%, VI - 15%.

Шкідники та хвороби озимих зернових культур

Зниження температури повітря та опади, що спостерігались в звітному періоді стримували розвиток та шкідливість ***злакових мух, попелиць, цикадок*** у посівах ***озимих зернових колосових*** культур.

Триває живлення личинок ***хлібного туруна (жужелиці)*** на 5% обстежених площ посівів озимої пшениці. Середня чисельність личинок - 0,2 екз./м², максимально - 1. За віковим складом личинки II віку становлять 70%, III – 30%.

Триває шкодочинність гусениць ***озимої совки*** II покоління на 10% обстежених площ посівів озимої пшениці, середня чисельність – 0,5 екз./м², максимально – 1 екз./м².

Утримання вологої погоди протягом звітного періоду сприяло подальшому розвитку та поширенню хвороб на озимих культурах.

Борошнистою росою уражено 10% обстежених площ, у середньому – 2% рослин, розвиток хвороби – 1%.

Септоріозом *у*ражено 5% обстежених площ, у середньому – 1% рослин, розвиток хвороби – 1%.

Кореневі гнилі виявлено на 2% обстежених площ посівів озимої пшениці, уражено 0,2% рослин, розвиток хвороби – 0,3%.

Шкідники та хвороби озимого ріпаку

Жуки ***ріпакового листоїда*** закінчують відкладання яєць на посівах озимого ріпаку. Заселено 20% обстежених площ, середня чисельність імаго становила 0,2 екз./м², яйцекладок - 0,3 екз./м².

Несправжні гусениці ***ріпакового пильщика*** завершують живлення на 25% обстежених площ посівів озимого ріпаку. Заселено у середньому 2% рослин, максимально – 4% за середньої чисельності 1 гус./м², максимально – 2.

Триває шкодочинність гусениць ***озимої совки*** II покоління на 35% обстежених площ. Середня чисельність шкідника становить 0,6 екз./м^2, в осередках до 2,0 екз./м^2. За віковим складом переважають гусениці IV - VI віків.

Пероноспорозом уражено 14% обстежених площ, у середньому – 1% рослин, максимально - 2%. Розвиток хвороби – 1%.