Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин в господарствах Херсонської області станом на 09.10.2026

Озима пшениця, озимий ячмінь – сівба, проростання зерна, сходи. Стан посівів добрий.

Озимий ріпак – сходи, 2-4 листки. Стан посівів добрий.

Соняшник – збирання.

Кукурудза – повна стиглість, збирання.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у першій декаді жовтня переважала тепла, суха, осіння погода з мінливою хмарністю, помірним вітром та коливанням температур. Суттєвих опадів у звітному періоді зафіксовано не було.

Тривалість сонячного сяйва за даними Агрометеорологічної станції Херсон склала 60 годин, що на 5 годин менше норми.

Середня декадна температура повітря становила +15,3-15,5°, що в межах кліматичної норми (1991-2020 рр.).

Максимальна температура повітря підвищувалась у найтепліші дні до+23-25℃.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч до +4-6℃.

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до +47-48℃, в нічні години охолоджувалась до +3-4℃.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила +16℃.

Середня відносна вологість повітря становила 69-72%, середній дефіцит вологості повітря за декаду - 5 мм (норма 5 мм). На півночі області упродовж 2 днів відносна вологість повітря в денні години знижувалась до 30% та нижче.

Кількість опадів за ІІІ декаду вересня склала 34-38 мм (224-280% декадної норми).

Вітер переважав північно-східного напрямку, 7–12 м/с.

Агрометеорологічні умови протягом звітного періоду складались цілком сприятливо для початкового росту та розвитку вже посіяних озимих культур. Завдяки опадам, які пройшли у ІІІ декаді вересня, зволоження ґрунту суттєво покращилось. Поточні вологозапаси забезпечують дружні та своєчасні сходи озимини.

Багатоїдні шкідники

Мишоподібні гризуни за чисельності 0,5-1,0, макс. 4,0 жилих колонії на гектар, продовжують зосереджуватися в місцях резервацій (на полях незораних після жнив, неугіддях, лісосмугах, садах, пасовищах) та на полях після збирання соняшнику, кукурудзи, овочевих культурах та багаторічних травах. Чисельність їх поступово збільшується. На занедбаних площах, які не обробляються, чисельність шкідника становить 2,1-4,0 жилих кол/га, з чисельністю жилих нір 8-15 шт./га. На багаторічних травах гризунів виявлено

на 50% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників - 1 кол./га з 2 житловими норами, максимально - 2 кол./га з 4 житловими норами.

В області триває проведення профілактичних агротехнічних заходів: лущення стерні та зяблева оранка, що позбавляє гризунів корму та надійного сховища.

Триває шкодочинність гусениць ***бавовникової совки*** III покоління на пізніх овочевих культурах та посівах озимого ріпаку. Заселено 4% посівів озимого ріпаку, у середньому – 1% рослин, чисельність – 0,5-1,2 екз./рослину.

Триває шкодочинність гусениць ***озимої совки*** II покоління на посівах озимих культур. Заселено 25% посівів озимого ріпаку та озимої пшениці, середня чисельність – середня чисельність – 0,5-1,1 екз/м^2, максимально – 2 екз/м^2.

В ареалі резервації (неорні землі, балки, толоки тощо) середня чисельність ворочків становить 0,3, максимально – 2 екз./м².

Шкідники озимих зернових культур

На посівах озимої пшениці, посіяної на стерньових попередниках, спостерігається шкодочинність личинок ***хлібного туруна (жужелиці)***. Заселено 3% обстежених площ посівів, середня чисельність личинок - 0,2 екз./м², максимально - 1 екз./м².

На посівах озимої пшениці триває відродження та шкодочинність личинок ***злакових мух.*** Личинок шведської мухи виявлено на 20% обстежених площ, середня чисельність - 1 екз./м², максимально – 3. Личинками пшеничної мухи заселено 10% обстежених площ за середньої чисельності 1,2 екз./м². Личинок гессенської мухи виявлено на 15% площ, середня чисельність - 0,6 екз./м², максимально – 4.

Хлібних блішок та ***цикадок*** виявлено на 10% обстежених площ озимої пшениці. Середня чисельність на 100 п.с. - 4 екз., максимально – 8 екз. Пошкоджено у середньому 1%, максимально - 2% рослин у слабкому ступені.

Попелицями заселено 15% обстежених площ посівів озимої пшениці, середня чисельність - 1 екз./росл., максимально – 1 кол., у середньому - 0,5% рослин.

Клоп-шкідлива черепашка перебуває у місцях зимівлі (лісосмуги), де його чисельність складає 0,3-0,5 максимально 2,0 екз/м^2, при заселенні 50% обстеженої площі.

Шкідники озимого ріпаку

В теплі сонячні дні на посівах озимого ріпаку продовжували шкодити ***хрестоцвіті блішки***, чисельність 0,5 – 3,0 екз./м^2, пошкоджено від 1% до 3% рослин, площа заселення – 55%. Очікується відкладання яєць.

Триває шкодочинність несправжніх гусениць ***ріпакового пильщика*** на 25% обстежених площ посівів озимого ріпаку. Заселено у середньому 2% рослин, максимально – 4% за середньої чисельності 1 екз/рослину, максимально – 2 екз/рослину.

Триває поодинокий літ метеликів ***капустяного та ріпакового біланів*** та спостерігається шкодочинність їх гусениць на 8% обстежених площ посіву озимого ріпаку, які пошкодили до 2% рослин, за чисельності 0,5-1 екз./м^2.

Завершується шкодочинність гусениць ***капустяної молі*** IV покоління на 22% площ, середня чисельність - 1 гус./росл., максимально – 2 при заселенні 2% рослин, максимально - 4%.

Попелицями заселено 32% обстежених площ посіву озимого ріпаку, у середньому - 1,5% рослин, середня чисельність – 1 кол./росл.

Виявлено шкодочинність та парування ***ріпакового листоїда***. Заселено 20% обстежених площ, середня чисельність імаго становила 0,2 екз./м². У наступній декаді очікується відкладання яєць.

Шкідники та хвороби плодових культур

Триває переміщення гусениць ***яблуневої плодожерки*** III покоління у місця зимівлі– під відсталу кору, рослинні рештки, у верхній шар грунту біля стовбурів дерев. За попередніми даними осінніх обстежень, шкідником заселено 40% дерев за середньої чисельності 1,8 гус./дерево, максимально – 5.

За попередніми даними осінніх обстежень, ***червоним кліщем*** заселено 80% дерев за середньої чисельності 2,3 яйця/п.м.г., максимально – 7. ***Бурим кліщем*** заселено 32% дерев, середня чисельність яєць – 1,5 екз./п.м.г., максимально – 3.

За попередніми даними осінніх обстежень ***вишневою мухою*** заселено 10% пристовбурних кіл дерев за середньої чисельності 3 лял./м², максимально – 5.