Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин в господарствах Херсонської області станом на 23.10.2026

Озима пшениця – сходи **– *2-***3 листки.

Озимий ячмінь – сівба, проростання зерна та сходи.

Озимий ріпак – утворення листової розетки.

Плодові дерева: *абрикос, слива* – осіннє забарвлення листя.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у другій половині ІІ декади жовтня погода була від помірно теплої до прохолодної осінньої, з періодичними дощами. Також вночі та вранці часто спостерігалися сильні тумани.

Середня декадна температура повітря становила +11,5-14,1°, що на 1,7-3,1° вище кліматичної норми (1991-2020 рр.).

Максимальна температура повітря підвищувалась у найтепліші дні до+24-26°С.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолоднішу ніч до +6-7°С.

Поверхня ґрунту в денні години нагрівалась до +36-42°С, в нічні години охолоджувалась до +3-4°С.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила +13-16°С.

Середня відносна вологість повітря становила 81-86%,.

Кількість опадів сумма за ІІ декаду жовтня склала 22-38 мм (180% декадної норми).

Вітер був змінних напрямків, 12–14 м/с.

Агрометеорологічні умови протягом декади були задовільними для осінньої вегетації озимих культур, та накопичення продуктивної вологи в ґрунті. Опади, які розпочалися з третьої декади вересня та продовжилися у першій половині жовтня, покращили запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту, але були недостатніми для поповнення вологою ґрунту до достатнього рівня.

Багатоїдні шкідники

Сприятливі погодні умови та достатня кількість кормів сприяють незначному збільшенню чисельності житлових нір ***мишоподібних гризунів*** та їх поширенню в агроценозах.

Триває розселення гризунів у середину полів озимої пшениці та озимого ріпаку. Шкідниками заселено 5% обстежених площ посівів озимих культур, виявлено поодинокі нори, максимально - 1 кол./га з 3 житловими норами (на крайових смугах).

На неорних землях **(**неугіддях, лісосмугах, на полях після збирання соняшнику, кукурудзи) ***мишоподібних гризунів*** виявлено за середньої чисельності 2,1-4,0 жилих кол./га, з чисельністю жилих нір 10-20 шт./га. Заселено 100% обстежених площ.

В ***багаторічних травах*** заселено 50% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників - 1 кол./га з 2 жилими норами, максимально - 2 кол./га з 4 жилими норами.

Найпоширеніші та найнебезпечніші в посівах ***сіра (звичайна) та гуртова полівки***, ***миша польова***. У північних районах на незораних полях після збирання врожаю спостерігаються колонії ***курганчикової миші*** в кількості 2 курганчика на гектар.

Триває шкодочинність гусениць ***озимої совки*** II покоління на посівах озимих культур. Заселено 35% посівів озимого ріпаку та 10% посівів озимої пшениці, середня чисельність - середня чисельність - 0,5 - 1,1 екз./м^2, максимально - 2 екз./м^2.

Шкідники та хвороби озимих зернових культур

Зниження температури повітря та опади, що спостерігались в звітному періоді стримували розвиток та шкідливість ***злакових мух, попелиць, цикадок*** у посівах ***озимих зернових колосових*** культур.

На озимині, розміщеної після стерньових попередників триває шкодочинність личинок ***хлібного туруна (жужелиці)*** за середньої чисельності личинок 0,2-0,5 екз./м^2, максимально 1 екз./м^2. Заселено 5% обстежених площ.

Триває шкодочинність гусениць ***озимої совки*** II покоління на 10% обстежених площ посівів озимої пшениці, середня чисельність – 0,5 екз./м², максимально – 1 екз./м².

Борошнистою росою уражено 5% обстежених площ, у середньому – 1% рослин, розвиток хвороби – 0,5%.

Септоріозом уражено 4% обстежених площ, у середньому – 0,5% рослин, розвиток хвороби – 0,5%.

Кореневі гнилі виявлено на 2% обстежених площ посівів озимої пшениці, уражено незначний відсоток рослин.

Шкідники та хвороби озимого ріпаку

Через дощову прохолодну погоду в посівах озимого ріпаку дещо знизилась активність шкідників: гусениць ***біланів, озимої совки***, несправжніх гусениць ***ріпакового пильщика, блішок, попелиці.***

Хрестоцвітими блішками за чисельність 0,2 – 1,0 екз./м^2, пошкоджено від 1% до 3% рослин, площа заселення – 40%.

Несправжніми гусеницями ***ріпакового пильщика*** за чисельності – 0,5-1,0 екз/рослину, заселено 25% площ, 2% рослин у слабкому ступені.

Завершується живлення гусениць ***капустяного та ріпакового біланів*** на 8% обстежених площ посіву озимого ріпаку, які пошкодили до 2% рослин, за чисельності 0,5-1 екз./м^2.

Попелицями на посівах озимого ріпаку заселено 32% обстежених площ та 1,5% рослин за середньої чисельності 1 кол./росл.

Продовжується живлення гусениць ***озимої совки*** II покоління на 35% обстежених площ. Середня чисельність шкідника становить 0,6 екз./м^2, в осередках до 2,0 екз./м^2. За віковим складом переважають гусениці IV - V віків.

Пероноспорозом уражено 14% обстежених площ, у середньому – 1,0% рослин, максимально - 2%. Розвиток хвороби – 0,5%.