Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин в господарствах Херсонської області станом на 06.11.2026

Озима пшениця – утворення вузлових коренів та кущіння. На 1 м^2 нараховувалось 350-534 рослини. Стан посівів добрий.

Озимий ячмінь – проростання зерна, сходи.

Озимий ріпак – утворення листової розетки. Стан посівів добрий.

Плодові дерева – осіннє забарвлення листя та початок листопада.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології на Херсонщині у звітному періоді погода відзначалася поступовим похолоданням та періодичними дощами, що супроводжувалися хмарністю з проясненнями.

Тривалість сонячного сяйва за даними Агрометеорологічної станції Херсон склала 17 годин, що на 25 годин менше за норму.

Середня декадна температура повітря становила +12,5-12,7°, що на 4,3-4,7° вище кліматичної норми (1991-2020 рр.).

Середньодобові температури протягом періоду перевищували багаторічні показники на 2-6°.

Максимальна температура повітря підвищувалась у тепліші дні до +15-18°.

Мінімальна температура повітря знижувалась у прохолодніші ночі до +8-9°.

Поверхня грунту в денні години нагрівалась до +26-28°, в нічні години охолоджувалась до +6-7°.

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила +13°.

Середня відносна вологість повітря становила 86-93%, середній дефіцит вологості повітря за декаду - 1 мм (норма 2 мм).

Кількість опадів склала 23-41 мм (233-515% декадної норми).

Вітер переважав північно-східного напрямку. Максимальна його швидкість досягала 10-11 м/с.

Агрометеорологічні умови протягом декади для подальшого осіннього розвитку озимих культур складались добре. Опади поступово поповнювали ґрунт вологозапасами, що добре впливало на ріст рослин.

Багатоїдні шкідники

Погодні умови, наявність достатньої кількості соковитого корму сприяють міграції ***мишоподібних гризунів*** на площі озимини, переважно з країв полів, де продовжується поступове наростання їх чисельності.

Триває розселення гризунів у середину полів озимих зернових та ріпаку. На посівах озимої пшениці гризунів виявлено на 10% обстежених площ посівів, середня чисельність - 1 кол./га з 1,2 житлової нори, максимально - 2 кол./га з 3 житловими норами.

На посівах озимого ріпаку шкідниками заселено 12% обстежених площ посівів, середня чисельність - поодинокі колонії з 1,2 житлової нори, максимально – 1 кол. з 3 житловими норами.

На неорних землях **(**неугіддях, лісосмугах, на полях після збирання соняшнику, кукурудзи) ***мишоподібних гризунів*** виявлено за середньої чисельності

2,1-4,0 жилих кол/га, з чисельністю жилих нір 10-20 шт./га. Заселено 100% обстежених площ.

На багаторічних травах заселено 50% обстежених площ, середня чисельність колоній шкідників - 1 кол./га з 2 жилими норами, максимально - 2 кол./га з 4 жилими норами.

У північних районах на незораних полях після збирання врожаю спостерігаються колонії ***курганчикової миші*** в кількості 2-4 курганчика на гектар.

На посівах озимих культур триває шкодочинність гусениць ***озимої совки*** II покоління. Заселено 35% посівів озимого ріпаку та 10% посівів озимої пшениці, середня чисельність - 0,5 - 1,1 екз/м^2, максимально - 2 екз/м^2. За віковим складом гусениці V віку - 75%, VI віку - 25%.

Шкідники та хвороби озимих зернових культур

Триває живлення личинок ***хлібного туруна (жужелиці)*** на 5% обстежених площ посівів озимої пшениці. Середня чисельність личинок - 0,2 екз./м², максимально - 1. За віковим складом личинки II віку становлять 75%, III – 25%.

Триває шкодочинність гусениць ***озимої совки*** II покоління на 10% обстежених площ посівів озимої пшениці, середня чисельність – 0,5 екз./м², максимально – 1 екз./м².

Волога погода звітного періоду з туманами та мрякою сприяла розвитку й поширенню хвороб на ранніх розкущених посівах озимої пшениці. Виявлено збільшення відсотка уражених площ та рослин.

Борошнистою росою уражено 12% обстежених площ, у середньому – 2% рослин, максимально – 4, розвиток хвороби – 1%.

Септоріозом уражено 6% обстежених площ, у середньому – 1% рослин, розвиток хвороби – 1%.

Кореневі гнилі виявлено на 3% обстежених площ посівів озимої пшениці, уражено 0,2% рослин, розвиток хвороби – 0,3%.

Шкідники та хвороби озимого ріпаку

Запкінчується опускання несправжніх гусениць ***ріпакового пильщика*** у ґрунт на заляльковування. Заселено 25% обстежених площ посівів озимого ріпаку, у середньому - 2% рослин, максимально – 4% за середньої чисельності 1 гус./м², максимально – 2.

Триває шкодочинність гусениць ***озимої совки*** II покоління на 35% обстежених площ. Середня чисельність шкідника становить 0,6 екз./м^2, в осередках до 2,0 екз./м^2. За віковим складом переважають гусениці V - VI віків.

Пероноспорозом уражено 15% обстежених площ, у середньому – 2% рослин, максимально - 5%. Розвиток хвороби – 1%.

Альтернаріоз виявлено на 5% обстежених площ посівів озимого ріпаку, уражено у середньому 1,5% рослин, максимально - 2%. Розвиток хвороби – 0,5%.